DESCRIPTIONS D'ARACHNIDES NOUVEAUX

par E. Simon.

Hebestatis nov. gen. — (*Cyclocosmia* E. Simon, olim ad part. *C. Theveneti*). — A *Pachylomero* differt oculis lateralibus utrinque subcontiguis, parte labiali ad apicem spinulis dentiformibus 6 vel 7 regulariter uniseriatis armata, coxa pedum-maxillarium intus ad basin spinulis similibus, aream parvam occupantibus, instructa, sterno longiore quam latiore, antice longius attenuato. — Typus *H.* (*Cyclocosmia*) *Theveneti* E. Simon, ex California.

Dans le genre *Pachylomerus* les yeux latéraux sont, de chaque côté, séparés au moins de leur rayon, la pièce labiale, plus obtuse, est armée de spinules peu nombreux presque irréguliers, formant un groupe longitudinal, les hanches de la patte-mâchoire sont garnies de spinules semblables, disséminés sur toute leur longueur, enfin le sternum est aussi large que long.

L'abdomen de l'exemplaire typique est déformé accidentellement, il ne doit pas différer de celui des *Pachylomerus*.

Calathotarsus nov. gen. — *A. Moggridgea* differt oculis lateralibus anticis ovatis mediis majoribus, oculis mediis posticis a mediis anticis et lateralibus posticis ut in *Eriodonti* æque et late distantibus, sed oculis lateralibus utrinque a sese parum remotis, postico insigniter parvo laterali antico plus quadruplo minore et fere duplo minore quam medio postico, chelis brevibus, apice deplanatis et valde crinitis, rastello carentibus, sed intus, usque ad basin, seriatim spinosis, parte labiali fere æque longa ac lata, apice obtusa et denticulis 4 vel 5 inordinatis munita, coxis pedum-maxillarium paulo longioribus, intus ad basin denticulis similibus paucis et inordinatis munitis, sterno antice longius attenuato, pone partem labialem vix impresso, haud canaliculato, pedibus quatuor anticis valde aculeatis, tibiis metatarsisque inferne deplanatis et utrinque aculeis seriatis validis longissimis et leviter curvatis instructis, extus aculeis minoribus paucis munitis, pedibus posticis muticis sed patellis tibiisque superne creberrime et longe setosis, metatarso 3^{i} paris superne setis spiniformibus crebre hirsuto, metatarso 4^{i} paris subtus ad apicem coronam setarum spiniformium insigniter marginato, unguibus superioribus graciliorибus ad basin dentibus binis parvis et iniquis instructo, ungue inferiore minore.

C. coronatus sp. nov. — ♀. Long. 15 mill. — Cephalothorax nitidus, fusco-lividus, parte thoracica plana dilutiore et fulva, glaber

sed ante oculos medios seta erecta longissima munitus, oculis mediis anticis et utrinque oculis lateralibus nigro-marginatis. Abdomen oblongum, convexum, fusco-violaceum, pilosum. Mamillæ testaceæ. Chelæ fusco-olivaceæ, nitidæ et glabræ, sed apice deplanatæ, crebre et longe crinitæ. Sternum pedesque fulvo-olivacea, tibiis quatuor anticis intus aculeis validis et pronis trinis, extus aculeis longioribus sed iniquis trinis aculeisque minoribus, metatarsis subtus ad marginem interiorem aculeis validissimis longioribus 4 vel 5, ad marginem exteriorem aculeis similibus trinis, cunctis aculeis minoribus intermixtis, instructis. — Chili.

Moggridgea quercina sp. nov. — ♀. Long. 8-10 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, sublævis, fovea thoracica sat lata parum recurva, utrinque leviter ampliata et rotunda, postice sulcum longitudinale breve emittente, parte cephalica utrinque foveola superficiali impressa. Oculi antici in lineam latam, leviter procurvam (superne visam subrectam), medii a lateralibus quam inter se evidenter remotiores, laterales paulo majores, leviter pro-minuli. Chelæ fuscæ, nitidæ. Abdomen ovatum, convexum, atro-violaceum. Partes oris, sternum coxæque fulvo-rufula, pars labialis denticulis inordinatis, inter se subsimilibus, saltem 30, armata, coxæ pedum-maxillarium denticulis similibus fere omnino obtectæ. Pedes fusco-castanei, antici tibia metatarsoque subtus deplanatis et utrinque valde aculeatis (aculeis ordinariis), femore 1^{i} paris compresso et curvato subtus subcarinato et setis spiniformibus fere inordinatis et iniquis, nonnullis ad basin leviter lanceolatis, femore 2^{i} paris setis spiniformibus biseriatis, interioribus maximis et validis 8-10, subtus instructis, coxa 3^{i} paris intus ad basin leviter prominula et setis densioribus et brevioribus, pronis, munita. Tarsi antici ungue interiore dente basali simplici, ungue exteriore dente basali inæqualiter bifido, armatis. — Africa australis : Prom. Bonæ Spei!

A *M. Dyeri* Cambr., cui affinis est, imprimis differt coxis pedum cunctis muticis haud spinulosis.

Nota. — Cette espèce est commune aux environs du Cap, notamment à New-Land, où elle construit, sur les écorces des chênes (*Quercus pedunculata*), une loge allongée fermée d'un opercule mince mais rigide, semblable à celle du *M. Dyeri*.

M. terricola sp. nov. — ♀. Long. 8-10 mill. — A præcedenti differt cephalothorace opaciore, fusco-castaneo, fovea profunda sed minore et validissime recurva sulcum haud emittente, clypeo directo, parte labiali denticulis 12-15 inordinatis, apicalibus basalibus longioribus, femoribus 2^{i} paris setis seriatis interioribus debi-

lioribus et paucioribus 5-6 et præsertim coxa 3^{i} paris ad basin leviter prominula spinis parvis acutis et erectis, aream parvam occupantibus, armata. — Africa austr. : Prom. Bonæ Spei!

Nota. — Cette espèce si voisine de la précédente a des mœurs très différentes, car elle n'est pas arboricole; elle creuse dans le sol un terrier profond et cylindrique fermé d'un opercule analogue à celui des *Nemesia*.

M. Peringueyi sp. nov. — ♀. Long. 16 mill. — A præcedentibus imprimis differt oculis lateralibus anticis maximis, mediis plus triplo majoribus, cephalothorace fusco-castaneo, sublævi, fovea sat angusta validissime recurva, sulcos binos tenuissimos et subcontiguos emittente, parte cephalica utrinque fovea lata impressa, clypeo directo, parte labiali denticulis 12-15 fere inordinatis (confuse transversim pluriseriatis), dimidio apicali tantum occupantibus, munita, denticulis coxarum pedum-maxillarium paucioribus, saltem ad apicem vittam angustam formantibus, coxis pedum cunctis omnino muticis, femore 1^{i} paris subtus setis tenuibus, femore 2^{i} paris setis biseriatis, interioribus 6-7 longioribus, munitis, tarsorum anticorum unguibus binis, dente basali longo, subtus denticulis minutissimis serrulato, armatis. — Africa australis : Matjesfontein!

A *M. Abrahami* Cambr., cui verisimiliter affinis est, differt oculis lateralibus anticis insigniter magnis et pedibus concoloribus.

Nota. — Cette espèce est terricole comme la précédente.

Pœcilomigas nov. gen. — A *Moggridgea* differt oculis anticis, superne visis, in lineam levissime recurvam, mediis rotundis lateralibus paulo majoribus et a lateralibus quam inter se remotioribus, pedum anticorum femoribus subtus obtusis, minus compressis, setis tenuibus inordinatis munitis, tibiis metarsisque subtus, inter spinas, crebre longe et tenuissime pilosis, metatarsis posticis pectine carentibus, tarsorum anticorum ungue exteriore dentibus basalibus binis, 1° majore, ungue exteriore dentibus trinis (basali minutissimo), tarsorum posticorum unguibus longioribus, in parte basali, dentibus seriatis 3 vel 4 armatis.

A *Migœ* differt, sec. L. Koch, parte cephalica utrinque foveolata, sulcis obliquis haud discreta, et oculis mediis anticis a lateralibus quam inter se evidenter remotioribus.

P. pulchripes sp. nov. — ♀. Long. 14 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, subtiliter opacus, fovea thoracica profundissima, validissime recurva, sulcum haud emittente, parte cephalica utrinque foveola superficiali angulosa impressa. Abdomen

oblongum, minute rugosum et pilosum, superne nigrum utrinque et subtus sensim albido-testaceum. Chelæ fusco-rufulæ, læves. Partes oris, sternum pedesque læte fulvo-rufula, femoribus infuscatis, tibiis metatarsisque, præsertim posticis, in medio late nigris. — Africa austro-orientalis : Natal (Dr C. Martin).

Pertica nov. gen. — A *Periegopi* differt cephalothorace humiliore, oculis sex, paulo majoribus, inter se subæquis et appropinquatis, quatuor anticis in lineam levissime procurvam, mediis a sese contiguis, a lateralibus spatio oculo haud latiore distantibus, et duobus posticis a lateralibus anticis subcontiguis, parte labiali magna, obtuse triquetra, sed non multo longiore quam ad basin latiore, laminis apice contiguis et membranaceis. A *Diguetia* differt cephalothorace haud impresso, oculis lateralibus anticis a mediis parum separatis et pedibus brevibus.

P. badia sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax sat humilis, longe ovatus, antice parum attenuatus, fronte lata et obtusa, rubro-castaneus opacus, tuberculis parvis setiferis conspersus, clypeo lato et convexo. Abdomen breve, convexum nigrum, setis longis conspersum, subtus regione epigasteris convexa fulvo-rufula. Chelæ fusco-castaneæ, sublæves. Sternum fusco-rufulum, coriaceum. Pedes robusti parum longi, longe setosi, fulvo-rufuli. — Brasilia merid. : prov. S. Paulo.

Clytætra Thisbe sp. nov. — ♀. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax humilis, fulvus, linea marginali exillima fusca cinctus, oculis singulariter nigro-cinctis. Oculi postici in lineam valde recurvam, inter se fere æquidistantes, medii lateralibus prominulis duplo minores. Oculi antici in lineam recurvam, inter se subæquales, medii a sese quam a lateralibus paulo remotiores. Area mediorum subquadrata, medii postici anticis minores. Abdomen sat breve, depressiusculum, antice posticeque attenuatum, antice truncatum, postice obtusum, supra fusco-olivaceum, lineolis nigris sinuosis transversim segmentatum et linea albida leviter flexuosa omnino circumdatum, subtus obscure fulvo-testaceum, utrinque linea dilutiore marginatum. Partes oris fuscæ. Chelæ, sternum pedesque fulva, femoribus tibiisque ad apicem leviter infuscatis, aculeis ordinariis armati. Area genitalis rufula, postice costa transversa parva, in medio leviter emarginata, limitata. — Ins. Taprobane : Galle!

A *C. Perroti* E. Sim., cui sat affinis est, differt magnitudine minore, pictura abdominis, oculorum linea antica postica non multo angustiore et area oculorum quatuor mediorum haud vel vix longiore quam latiore.

Mecynogea nov. gen. — A *Gea* differt cephalothorace longiore, oculis quatuor mediis aream subparallelam et longiorem quam latiorem occupantibus, anticis posticis paulo majoribus, oculis quatuor anticis, antice visis, in lineam leviter recurvam (in *Gea* rectam) et clypeo oculis mediis angustiore, oculis lateralibus utrinque contiguis, antico postico vix duplo minore (in *Gea* saltem quadruplo minore), abdomine multo longiore, cylindraceo, antice obtusissime bigibboso, postice leviter prominulo, pedibus longioribus.

M. bigibba sp. nov. — ♀. Long. 11 mill. — Cephalothorax longus, luteo-testaceus, linea media exili, extremitates haud attingente et utrinque vitta marginali lata, nigerrimis, notatus. Oculi postici magni, inter se fere æquidistantes, in lineam leviter procurvam. Abdomen longum, antice convexum et superne tuberibus binis humilibus et obtusis subcontiguis notatum, postice leviter attenuatum et apice paululum prominulum, flavidum, supra tuberibus anticis fulvo-rufulis dein vitta lata obscuriore albo-marginata, in parte prima vittam nigram apice leviter cruciatam, postice strias transversas fuscas includente, ornatum, subtus vitta latissima nigra lineis quatuor, interioribus abbreviatis testaceis, exterioribus longis et leviter sinuosis albis, notata, fere omnino obtectum. Chelæ læves et nitidæ, fulvo-rufulæ, apice minute fuscæ, margine superiore sulci dentibus trinis contiguis, medio obtuso reliquis multo majore, inferiore dentibus binis æquis a sese separatis denteque ultimo minutissimo, armatis. Partes oris nitidæ, nigræ, intus late testaceo-marginatæ. Sternum nigrum, opacum, vitta media fulva, postice attenuata, sectum. Pedes sat longi, lutei, femoribus subtus, saltem anticis, leviter infuscatis et olivaceis, femoribus tibiisque ad apicem angustissime fusco-cinctis. Tuberculum genitale nigrum, latius quam longius, apice attenuatum sed truncatum, superne leviter depressum. — Brasilia : prov. Goyaz.

M. tucumana sp. nov. — ♀. Long. 9 mill. — A præcedenti, cui subsimilis est, differt imprimis oculis posticis paulo minoribus, in lineam valde procurvam, lateralibus mediis evidentius minoribus. Cephalothorax luteus, linea media exili, oculos haud attingente, et utrinque vitta marginali latiore nigris, notatus. Abdomen cinereo-albidum, utrinque leviter nigricanti reticulatum, supra vitta lata, in medio angulosa, aurantiaca, in parte basali lineolas binas contiguas albas prope apicem maculas nigricantes includente, in lateribus lineis binis integris et sinuosis albis, subtus vitta latissima utrinque linea et postice maculis binis (antica majore) albis marginata, structe decoratum. Cætera ut in *M. bigibba*. — Resp. Argentina : Tucuman.

Nemospiza nov. gen. — A *Nemoscolo* differt oculis mediis posticis a sese quam a lateralibus remotioribus, spatio interoculari oculo latiore, area quatuor mediorum antice quam postice non multo latiore, clypeo latiore convexo et leviter proclivi, pedibus anticis reliquis multo robustioribus, tibia intus ad apicem aculeis brevibus dentiformibus trinis, transversim seriatis, armata, metatarso curvato, utrinque setis spiniformibus longis et erectis 10 vel 12, regulariter seriatis, insigniter fimbriato.

N. conspicillata sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax lævis et glaber, nigro-olivaceus, subtilissime reticulatus. Abdomen longum, cylindraceum, postice leviter ampliatum atque obtusum, supra nigro-nitidum, antice maculis magnis ovatis binis, prope medium maculis parvis quatuor, aream subquadratam formantibus et utrinque macula majore subrotunda, atque ad apicem macula transversa albo-opacis decoratum, subtus atro-testaceum, utrinque, secundum mamillas (longe ante medium ventrem et prope plicam genitalem sitas), punctis binis, pone mamillas vitta media confuse dilutiore, notatum. Chelæ fulvæ. Partes oris sternumque nigro-nitida. Pedes flavidi, antici, femoribus exceptis, paulo obscuriores et aurantiaco-tincti, metatarsis curvatis, utrinque setis spiniformibus longis, regulariter seriatis, munitis. — Africa australis : Transvaal !

Ideocaira nov. gen. — A *Caira*, cui affine est, differt imprimis pedibus 3^{i} paris haud insigniter aculeatis (in *Caira* ut in pedibus anticis metatarsis valde aculeatis et curvatis) et area oculorum mediorum paulo longiore quam latiore (vel saltem haud latiore) et postice quam antice multo angustiore.

I. transversa sp. nov. — ♀. Long. 8-10 mill. — Cephalothorax longus, antice valde attenuatus et acuminatus, humilis, superne planus, parte cephalica sulcis obliquis profundis et integris discreta, fulvo-rufulus, antice paulo dilutior, crebre et longe albido-hirsutus. Area oculorum mediorum subverticalis, circiter æque longa ac lata, medii postici anticis minores, spatio oculo evidenter latiore a sese distantes. Abdomen fulvo-rufulum, lineolis transversis dilutioribus tenuibus et parum expressis segmentatum, subtus dilutius, in medio fere albidum, latius quam longius, antice late truncatum et utrinque ad angulum tuberculo conico suberecto munitum, postice valde declive et rotundum. Chelæ, partes oris, sternum pedesque fulvo-rufula, pedes quatuor antici paulo obscuriores, pedes 4^{i} paris patella ad basin tibiaque ad apicem nigricantibus. Chelarum margo superior dentibus binis 1° multo majore, margo inferior dentibus minoribus æquis binis et interdum dente ultimo parvo

armati. Pedes quatuor antici reliquis multo robustiores et longiores, patellis longis, tibiis metatarsisque superne deplanatis, tibiis validis, compressis et curvatis, supra aculeis sat brevibus uncatis, intus aculeis rufulis et rectis, multo majoribus, inter se iniquis, biseriatis (plerumque 6-7), metatarsis curvatis, aculeis robustis sed multo minoribus, præsertim ad basin numerosis et fere inordinatis, instructis. — Africa austro-orientalis : Natal (Dr C. Martin).

I. triquetra sp. nov. — ♀. Long. 7-8 mill. — Cephalothorax fere præcedentis sed fulvo-olivaceus et albido-hirsutus, parte cephalica postice fusco-marginata et punctis mediis binis fuscis parum expressis notata. Oculi medii postici a sese spatio oculo vix latiore distantes. Abdomen fulvo-olivaceum, antice in declivitate parce nigro-punctatum et puncto medio, reliquis majore, notatum, subtus nigrinum et testaceo-variatum, haud latius quam longius, antice truncatum et utrinque angulosum, postice valde attenuatum et apice prominulum, haud declive. Chelæ fulvæ, margine superiore sulci dentibus binis, 1° multo majore, margine inferiore dentibus trinis subcontiguis et acutis, medio reliquis paulo minore, armatis. Partes oris sternumque interdum nigra, interdum fulvo-rufula. Pedes ut in præcedenti aculeati, fulvo-olivacei, plerumque valde nigricanti punctati et plagiati. Tuberculum genitale nigrum, obtuse triquetrum, superne tenuiter marginatum. — Africa australis : Pt Elizabeth (Dr C. Martin).

Archemorus curtulus sp. nov. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax brevis, subquadratus, altissimus, fusco-castaneus, coriaceus, pilis crassis depressis subsquamiformibus flavido-nitidis, vestitus. Oculi fere ut in *A. Simsoni* ordinati, quatuor medii aream maximam subverticalem, multo longiorem quam latiorem et postice quam antice multo latiorem, occupantes, medii postici anticis multo majores et singulariter prominuli, oculi laterales a mediis late remoti, utrinque valde prominuli. Abdomen latius quam longius, ovato-transversum supra planum, duriusculum, antice sigillis parvis longis et seriatis 9, in medio sigillis binis multo majoribus longis et obliquis impressum, fuscum, late flavido-marginatum, subtus atrum sed antice macula parva transversa fulva notatum. Chelæ fusco-castaneæ, ad basin minute rugosæ, præterea læves. Sternum nigrum, parce granulosum. Pedes breves, rubro-castanei, coxis femoribusque nigris, tarsis luteis, tibiis metatarsisque anticis superne deplanatis, tibiis intus, metatarsis et intus et extus aculeis fulvis tenuibus et erectis, divaricatis et regulariter seriatis, inter se iniquis, nonnullis longissimis, armatis. — Australia orientalis.

Epecthinula nov. gen. — Ab *Epecthina* differt oculis quatuor anticis, ad marginem frontalem sitis, inter se subaequis, mediis a

sese auguste separatis a lateralibus contiguis, oculis mediis posticis remotissimis, medium partis cephalicæ fere occupantibus, longis subplanis a sese juxta contiguis, abdomine globoso, haud turbinato, sterno convexo, postice, inter coxas disjunctas, producto, pedibus brevioribus.

E. minutissima sp. nov. — ♀. Long. 0.8 mill. — Cephalothorax brevis, altus, parte cephalica convexa, fusco-castaneus, lævis, prope marginem leviter rugosus. Oculi sex albi inter se subæquales, quatuor antici marginem frontalem occupantes et lineam leviter recurvam designantes, medii a sese disjuncti a lateralibus contigui, oculi medii postici a reliquis oculis late distantes et medium partis cephalicæ fere occupantes, ovati, subplani et a sese juxta contigui. Clypeus sat angustus, valde reclinatus. Abdomen magnum, globosum, partem thoracicam omnino obtegens, supra duriusculum et nitidum, fusco-lividum, confuse et vix distincte testaceo-marmoratum. Sternum nigro-nitidum, leviter convexum, inter coxas posticas productum. Pedes breves sat robusti, flavo-aurantiaci, parce setosi. — Jamaica.

Anaptomecus nov. gen. — Cephalothorax longior quam latior, parte cephalica sat angusta et longa, leviter convexa, sulcis profundis et integris discreta, thoracica utrinque ample rotunda, sulco medio lato et profundo omnino divisa. Area oculorum latitudinem frontalem totam occupans. Oculi antici in lineam rectam, inter se anguste et æque separati, medii lateralibus duplo minores. Oculi postici in lineam multo latiorem, valde recurvam, inter se fere æquidistantes, laterales mediis paulo majores. Area mediorum longior quam latior et antice quam postice angustior, medii antici posticis paulo majores. Clypeus verticalis planus, oculis anticis plus triplo latior. Chelæ verticales et longæ, antice setis longissimis tenuibus et curvatis paucis seriatis munitæ, margine inferiore sulci dentibus principalibus trinis sat longis, æquis dentibusque multo minoribus seriatis et contiguis, armato. Partes oris sat longæ. Abdomen cylindratum et longum fere *Tetragnathæ*. Pedes longi et tenues, aculeis longissimis gracilibus, subverticillatis, armati, tarsis haud scopulatis sed, sub unguibus, fasciculis parvis setarum spathuliformium munitis, unguibus gracilibus et longis, apice curvatis, prope medium dentibus tenuibus 6-7, versus basin sensim minoribus, armatis.

A *Pandercete* differt cephalothorace longiore, oculis posticis inter se fere æquidistantibus et subæquis.

A. longiventris sp. nov. — ♀ (pullus). Long. 10 mill. — Cephalothorax pallide lutescens, parce flavido-pilosus, oculis singu-

lariter nigro-cinctis. Abdomen cylindratum et longum, supra albo-opacum, vitta media lata nodosa fulva et albo-punctata notatum, subtus fulvo-testaceum. Chelæ, partes oris sternum pedesque pallide fulva, chelæ antice setis paucis albidis, curvatis et seriatis munitæ. Pedes aculeis gracilibus et longissimis, pellucentibus instructi. — Ecuador sept. : Cayambe.

Odo guttipes sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax humilis, lævis, pallide luteus, vittis binis parallelis, oculos laterales posticos attingentibus, vittaque marginali cinereo-pilosis, parum expressis, notatus. Oculi ordinarii, late singulariter nigro-marginati. Clypeus oculis mediis anticis angustior (abdomen detritum). Chelæ, partes oris, sternum pedesque pallide lutea, lævia. Chelæ antice vitta fusca, apicem haud attingente, notatæ, margine inferiore sulci dentibus binis subæquis armato. Pars labialis leviter infuscata. Sternum utrinque ad marginem maculis parvis fuscis trinis notatum. Pedes longissimi, apice tenues, postici anticis longiores, patellis utrinque nigro-plagiatis, reliquis articulis, ad radicem aculeorum, minute nigro-guttulatis, aculeis ordinariis longis. Pedes-maxillares pallide lutei, tenues et longi; tibia patella longiore, leviter curvata, apophysi apicali rufula depressa, recte truncata, cum angulis minute prominulis, superiore obtuso, inferiore nigro acuto et uncato, extus armata; tarso anguste ovato, obtuso, supra crasse piloso; bulbo simplici, rufulo, apice stylo brevi dentiformi et subrecto munito. — Tasmania : Hobart.

Tasata nov. gen. — Ab *Arachosia* differt oculis anticis apicibus in lineam rectam, mediis lateralibus saltem 1/3 minoribus, ab *Oxysomati* differt oculorum linea postica magis procurva, linea antica non multo latiore, oculis lateralibus utrinque subæquis et imprimis margine inferiore sulci chelarum tridentato. Plica stigmatica evidentissime pone medium ventrem sita.

T. parcepunctata sp. nov. — ♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax fulvus, longe et crebre pallide luteo-pilosus, parte cephalica antice, pone oculos et utrinque, minute nigro-notata et lineata, parte thoracica utrinque punctis parvis seriatis 3 vel 4 et postice puncto medio, nigris, notata. Abdomen oblongum, fulvum, minute et crebre nigro-punctatum atque ad marginem anticum puncto nigro majore notatum. Chelæ luteæ, nitidæ, margine inferiore sulci dentibus trinis æquis armato. Partes oris, sternum pedesque lutea, pedes crebre et distinctissime nigro-punctati, parum longi, tibiis anticis aculeis inferioribus longissimis 3-3, apicalibus reliquis multo minoribus, et utrinque aculeis lateralibus similibus binis, metatarsis scopulatis, aculeis inferioribus subbasilaribus longis-

simis binis et utrinque aculeo laterali simili instructis. Plaga genitalis fusca, crasse et longe pilosa, subrotunda sed antice obtuse truncata, postice sulco parallelo et marginato divisa. — Respublica Argentina.

Patrera nov. gen. — A *Vulfila*, cui affine est, differt oculis posticis multo majoribus, inter se æque et anguste distantibus (spatiis interocularibus oculis minoribus) superne visis in lineam levissime recurvam, oculis anticis inter se valde appropinquatis in lineam rectam, mediis lateralibus plus quintuplo minoribus.

P. fulvastra sp. nov. — ♂. Long. 9 mill. — Cephalothorax ovatus, fronte mediocri, stria thoracica longa, fulvo-rufescens, breviter flavido-nitido-pubescens, area oculorum infuscata. Abdomen longe oblongum, fusco-cinereum, pallide flavido-nitido-pubescens, mamillæ fulvæ, superiores dilutiores, graciliores, paulo longiores, articulo apicali distincto. Chelæ longæ et proclives, fulvo-rufulæ, pilosæ, margine inferiore sulci dentibus seriatis sub æquis 5 vel 6 armato. Laminæ sternumque lutea. Pars labialis infuscata. Pedes fulvo-rufuli, longissimi, metatarsis tarsisque tenuibus, anticis leviter scopulatis, aculeis gracilibus, ut in *Vulfila* ordinatis, armati. Pedes-maxillares fulvi, tarso bulboque fusco-rufulis; femore curvato, supra aculeis 1-3 armato; patella longiore quam latiore; tibia patella paulo longiore, angustiore et leviter curvata, intus setis validis longissimis paucis munita, extus apophysi apicali nigro-nitida, longa, recta et antice, secundum marginem tarsi, directa, armata; tarso magno, ad basin longe ovato et depressiusculo, ad apicem longe producto, cylindraceo et leviter curvato; bulbo longe ovato, intus lamina magna styloque libero marginato. — Ecuador sept. : Cayambe.

Mesilla nov. gen. — A *Crago*, cui verisimiliter affine est, differt oculis anticis inter se valde iniquis, mediis lateralibus plus triplo minoribus, parte labiali multo longiore quam latiore, tibiis anticis (feminæ) aculeis inferioribus tenuibus et longissimis 5-5 tantum armatis et rima stigmatica, ut in *Aysha*, ante medium ventrem sita.

M. vittiventris nov. sp. — ♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax humilis, longe ovatus, fulvo-olivaceus, antice leviter infuscatus, albo-sericeo-pubescens. Oculi postici in lineam procurvam, inter se æquales et fere æquidistantes (medii a sese quam a lateralibus vix remotiores). Oculi antici in lineam angustiorem rectam, medii lateralibus plus triplo minores, a sese contigui, a lateralibus anguste distantes. Area mediorum longior quam latior et antice quam postice multo angustior. Abdomen longum, cylindraceum, fulvo-testaceum, albo-sericeo-subargenteo-pubescens, subtus antice macula cruciata T formante, prope medium lineis binis subconti-

guis longitudinalibus et utrinque maculis binis obliquis nigricantibus, notatum, mamillæ longæ testaceæ. Chelæ angustæ, longæ et proclives, fulvo-rufulæ, nitidæ et pilosæ, margine superiore sulci dentibus seriatis 6, 5° reliquis majore, inferiore dentibus minoribus binis, inter se latissime distantibus, dein dentibus minutissimis et contiguis, armatis, ungue valido et longo. Partes oris longæ, laminæ fulvo-rufulæ, pars labialis fusca. Sternum fuscum, confuse plagiatum. Pedes longissimi et gracillimi, pallide flavidi subpellucentes, tibiis anticis feminæ aculeis tenuibus et longis 5-5, metatarsis, fere filiformibus, aculeis basalibus quatuor instructis. Pedes-maxillares longi, tibia patella triplo longiore setis spiniformibus longissimis et curvatis ad basin munita; tarso tibia saltem æquilongo, apice levissime incrassato et rufulo-tincto. Plaga genitalis magna, subquadrata, nitida et rufula, utrinque fovea subrotunda, postice fovea media ovata, valde impressa. — Ecuador sept. : Cayambe.

Coryssiphus nov. gen. — Cephalothorax ovatus, sat convexus, stria thoracica longa. Oculi antici inter se subæquales (medii vix majores) et subcontigui, in lineam leviter procurvam, oculi postici paulo minores, inter se subæquales et fere æquidistantes, in lineam paulo latiorem, leviter procurvam. Area mediorum paulo longior quam latior et antice quam postice angustior. Chelæ verticales, longæ et cylindraceæ, marginibus sulci longe obliquis, superiore setis validis longissimis, inferiore dentibus parvis binis, a sese remotis, munitis, ungue valido et longo. Laminæ sat breves, apice obtusæ, in medio leviter depressæ. Pars labialis haud vel vix longior quam latior, apice leviter attenuata et truncata. Sternum late cordiforme, apice breviter subacutum. Mamillæ inferiores depressæ, ad basin distincte separatæ, superiores paulo longiores et graciliores, articulo apicali parvo et conico munitæ. Pedes sat longi, ita longitudine I, IV, II, III (I et IV inter se subæquales). Pedes 1ⁱ paris patella insigniter longa, tibia aculeis pronis tenuibus vel validis (*C. unicolor* E. S.) biseriatis 7-7 vel 6-6, metatarso in dimidio basali aculeis similibus 2-2, subtus armatis, tarsis tenuibus et longis. sub unguibus fasciculis parvis sed densis munitis.

A *Mesiotelo*, cui sat affinis est differt oculorum linea postica, superne visa, evidenter procurva, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus longissimis et pronis seriatis munitis sed seriebus setarum carentibus; a *Scotina* oculis mediis anticis lateralibus haud minoribus, oculis posticis a sese æquidistantibus, fronte latiore, tarsis cunctis fasciculis munitis abunde differt.

C. præusta sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax lævis et nitidus, fulvo-rufescens, ad marginem leviter infuscatus. Oculi

antici inter se æquales. Clypeus oculis anticis paulo latior. Abdomen ovatum, antice obtuse truncatum, supra atrum, vix distincte testaceo-punctatum et antice vitta longitudinali albido-testacea notatum, subtus dilutius. Mamillæ luteæ. Chelæ et partes oris fusco-castaneæ. Sternum, pedes-maxillares pedesque fulvo-rufescentia, tibiis anticis aculeis 7-7 metatarsis aculeis 2-2 subtus armatis. Pedes-maxillares graciles et longi; femore subrecto, setis longis nigris subtus munito; patella plus triplo longiore quam latiore; tibia patella multo longiore, cylindracea, parce aculeata apophysi apicali nigra divaricata, apice minute uncata, armata; tarso anguste ovato, tibia paulo breviore; bulbo parvo simplici, disciformi. — Africa australis : Prom. Bonæ Spei!

C. cinerascens sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax lævis et nitidus, pallide fulvo-rufescens, linea fusca marginatus. Oculi medii antici lateralibus paulo majores. Clypeus oculis anticis haud latior. Abdomen oblongum, pallide luteo-testaceum. Chelæ rufulæ. Sternum pedes-maxillares pedesque pallide fulvo-rufescentia, tibiis anticis aculeis 6-6, basalibus reliquis minoribus, metatarsis aculeis longioribus 2-2 subtus armatis. Pedes-maxillares fere præcedentis. — Prom. Bonæ Spei!

C. unicolor sp. nov. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, regione oculari infuscata, lævis, pilis albidis longis et pronis vestitus. Oculi antici inter se subæquales, medii a sese anguste separati, a lateralibus subcontigui. Clypeus oculis anticis paulo angustior. Partes oris fuscæ. Chelæ, sternum pedesque fulvo-rufula, pedes sat longi, tarsis gracilibus, tibiis anticis aculeis fuscis longissimis, validis, minute singulariter elevatis et pronis 6-6 vel 7-7, metatarsis aculeis similibus 2-2, subtus armatis. Abdomen cinereo-testaceum, mamillæ rufulæ. Plaga genitalis parva, paulo latior quam longior, rufula et nitida, striis binis nigris, antice convergentibus, divisa. — Prom. Bonæ Spei!

Pescennina nov. gen. — Cephalothorax convexus, stria carens, ovatus, antice posticeque fere æqualiter attenuatus, postice truncatus. Oculi sex, inter se appropinquati, quatuor postici in lineam leviter procurvam, medii nigri lateralibus albis paulo minores et a lateralibus quam inter se paulo remotiores et duo antici, reliquis paulo majores, a lateralibus posticis contigui a sese spatio oculo vix minore distantes. Pars labialis magna, longior quam latior, laminæ ad basin latæ, ad apicem angustæ, sat longæ et subrectæ. Sternum maximum, convexum sed multo longius quam latius, coxis cunctis subglobosis exsertibus. Pedes mutici et tenues sed metatarsis anticis sat robustis, ita longitudine IV, I, II, III, pedes 4^{i} paris reliquis multo longiores, tarsis cunctis sat brevibus.

Nota. — Les caractères de ce genre sont très ambigus et rappellent ceux des *Oonopides*; je le rapproche cependant des *Micaria* et surtout des *Sphingius*.

P. epularis sp. nov. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax lævis et nitidissimus sed ad marginem, præsertim postice, minute rugosus, rubro-castaneus, anguste nigricanti-marginatus. Abdomen longe oblongum, depressiusculum, fulvum, supra scuto maximo, postice truncato, antice attenuato, leviter canaliculato et plicato, fusco, maculis anticis binis albo-pilosis, maculaque media magna grossa, lætissime aurata, decorato, obtectum, postice loro fusco angusto et curvato marginatum, subtus testaceum, pilis aureis micantibusque paucis ornatum, regione epigasteris convexa, coriacea, fusco-rufula. Chelæ et partes oris fuscæ. Sternum rubro-castaneum, valde coriaceo-striolatum. Coxæ olivaceæ. Pedes antici luteo-aurantiaci, femoribus dilutioribus, pedes postici fusco-olivacei vel nigricantes, patellis ad basin metatarsis ad partem tarsisque luteis. Pedes-maxillares parvi nigri. — Venezuela : Caracas ! San Esteban !

Sphingius tristiculus sp. nov. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, valde coriaceus. Oculi antici inter se subcontigui, in lineam valde procurvam, medii nigri lateralibus paulo minores. Oculi postici in lineam haud latiorem subrectam (vix recurvam), inter se æquales, medii subplani inter se contigui, a lateralibus anguste separati. Clypeus oculis lateralibus anticis multo angustior. Abdomen molle, longum et cylindratum, atro-nitidum, parce et breviter pilosum, mamillæ parvæ luteæ. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Chelæ sublæves, validæ, ad basin convexæ et intus setis nigris longis paucis munitæ, marginibus sulci longe obliquis, inferiore dentibus parvis binis æquis, a sese distantibus, armato. Sternum valde coriaceum et punctatum, inter coxas posticas disjunctas productum. Coxæ (3^{æ} exceptæ) insigniter longæ, cylindraceæ. Pedes longi, graciles, sed femoribus sat robustis et compressis, fulvo-rufuli, coxis femoribus tibiisque anticis valde infuscatis interdum fere nigris, femoribus posticis leviter infuscatis, pedes quatuor antici omnino mutici, postici minute et parce aculeati. Fovea genitalis profunda, longior quam latior, antice truncata, postice ampliata et rotunda.

♂. Long. 6 mill. — A femina differt abdomine scuto duriusculo nigro et coriaceo omnino obtecto. — Pedes-maxillares sat breves, fusco-rufuli apice dilutiores ; femore robusto, compresso et recto, subtus leviter inæquali; patella longiore quam latiore superne convexa; tibia patella circiter æquilonga, superne deplanata, apophysi apicali sat longa, simplici et recta, antice directa, extus

armata; tarso breviter ovato, obtuso; bulbo convexo, subgloboso, apice lamina brevi et uncata munito. — Annam : Phuc-Son (H. Fruhstorfer).

Orthobula sicca sp. nov. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax rubro-castaneus, parte cephalica antice et utrinque, thoracica ad marginem infuscatis, valde coriaceus, parte cephalica subtiliter transversim plicata, thoracica punctis impressis, lineas radiantes formantibus, munita. Oculi antici in lineam subrectam, inter se subæquales, medii a sese anguste separati, a lateralibus contigui. Oculi postici in lineam latiorem recurvam, inter se fere æque et sat late distantes, medii lateralibus vix minores. Abdomen subrotundum, planum, scuto nitido fulvo, antice macula parva longitudinali et utrinque macula majore triquetra, postice macula transversa, nigris, ornato, supra omnino obtectum, subtus fulvum, albido-pilosum. Chelæ et partes oris nigræ. Sternum magnum, rufulum, læve sed grosse impresso-punctatum. Pedes sat breves, flavido-aurantiaci, tarsis dilutioribus, tibiis anticis aculeis longis et pronis fulvis, ad basin minute fuscis, 5-5 (apicalibus minoribus), metatarsis aculeis similibus 3-3 subtus armatis. Plaga genitalis fusca, coriacea, parallela, postice oblique biimpressa. — Madagascar : Antongil (Mocquerys).

Myro maculatus sp. nov. — ♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax obscure fusco-castaneus, lævis, modice convexus. Oculi postici in lineam validissime procurvam semicircularem, medii lateralibus paulo minores et a sese quam a lateralibus paulo remotiores. Oculi antici in lineam angustiorem, valde procurvam, medii lateralibus ovatis saltem triplo minores. Area mediorum plus duplo angustior antice quam postice. Clypeus oculis anticis paulo angustior. Abdomen oblongum, atro-testaceum, supra antice vittis longitudinalibus trinis latis et ovatis subcontiguis, lateralibus leviter curvatis, dein maculis parvis triquetris biseriatis subcontiguis et utrinque maculis majoribus trinis, pallide luteis, supra ornatum, subtus fulvum. Chelæ validæ et longæ, rufulæ, nitidæ et glabræ, margine inferiore sulci longe obliquo, dentibus acutis æquis et æquidistantibus trinis denteque ultimo minore armato, ungue longo. Partes oris fuscæ. Sternum nitidum, fulvum, utrinque late infuscatum. Pedes mediocres fusco-rufuli, femoribus subtus dilutioribus et late fusco-annulatis, pedes antici parce et minute aculeati, postici numerose aculeati. Area genitalis rufula, leviter rugata, plagula media parva acute cordiformi, fulvo-nitida, notata. — Tasmania : Hobart.

Rubrius milvinus sp. nov. — ♀. Long. 10 mill. — Cephalothorax ovatus, convexus, lævis, parce pilosus, castaneo-rufescens,

parte cephalica antice leviter obscuriore, thoracica lineolis radiantibus vix expressis notata. Oculi postici inter se æquales, in lineam leviter procurvam, medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Oculi antici in lineam magis procurvam, medii lateralibus saltem 1/3 minores. Area mediorum vix longior quam latior et antice quam postice angustior. Clypeus oculis lateralibus anticis latior. Abdomen oblongum, supra nigricans, sat crebre et longe setosum, antice vitta longitudinali, dein maculis parvis laciniosis quadriseriatis luteo-testaceis ornatum, subtus fulvo-testaceum. Chelæ rufulæ, nitidæ et glabræ, validæ, ad basin geniculatæ, margine inferiore sulci longe obliquo, dentibus binis æquis remotis submediis armato, ungue longo. Partes oris sternumque fusco-castanea. Pedes fulvo-rufuli, metatarsis tarsisque obscurioribus, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus 3-3, apicalibus minoribus, atque intus aculeis lateralibus debilibus armatis. Pedes postici numerose aculeati, sed tarsis gracilibus, muticis. Plaga genitalis maxima, semicircularis nigra et rugosa, antice plagula ovata, in medio depressa et rugosa, postice plagula majore plana cordiformi, utrinque ad angulum plagula subrotunda et convexa fulvo-nitidis, notata. — Tasmania : Hobart.

R. paroculus sp. nov. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax lævis, fusco-olivaceus, versus marginem sensim obscurior, pilis longis pronis, nonnullis plumosis, albo-sericeis vestitus. Oculi cuncti sat magni et inter se subæquales, quatuor postici in lineam leviter procurvam, a sese fere æque et non late distantes, antici a sese valde appropinquati, in lineam subrectam, area mediorum longior quam latior. Clypeus oculis anticis non multo latior. Abdomen breviter ovatum, supra flavido-testaceum, late nigricanti-marginatum et vitta media lata fusca confusa notatum, subtus fusco-testaceum minute nigricanti-punctatum. Chelæ fuscæ, margine inferiore sulci dentibus principalibus binis æquis dentibusque multo minoribus 4-5 contiguis armato. Pars labialis nigra, testaceo-marginata. Sternum nigrum. Laminæ pedesque pallide fusco-olivacea. Pedes parum longi, valde aculeati. Mamillæ inferiores nigræ, superiores testaceæ. Area genitalis magna, transversa, nigra, plagula media cordiformi antice acuta, notata. — Tasmania : Hobart.

Espèce très anormale, qui deviendra sans doute le type d'un genre particulier.

R. periscelis sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax valde convexus, lævis, pallide luteus, regione oculorum nigra, parte cephalica linea media exili oculos haud attingente et utrinque vitta latiore et obliqua, postice convergente et V magnum formante,

parte thoracica vitta marginali lata et reticulata, fusco-olivaceis, notatus. Oculi postici in lineam leviter procurvam, inter se æqui et fere æquidistantes. Oculi antici in lineam vix procurvam subrectam, posticis majores, inter se subæquales, anguste et fere æque separati. Clypeus oculis anticis haud latior. Abdomen oblongum, pallide testaceum, albido-pilosum, supra parce nigro-punctatum, punctis densioribus antice vittam abbreviatam, in medio vittas duas, postice convergentes, designantibus, notatum, subtus punctis nigris, vittam latam confusam formantibus, notatum, mamillis testaceis, utrinque nigro-marginatis. Chelæ validæ, læves, fulvo-rufulæ. Laminæ fulvæ. Pars labialis fusca. Sternum fulvum et nitidum, utrinque late infuscatum. Pedes pallide lutei, valde fusco nigrove annulati, numerose aculeati, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus lateralibusque et tibiis aculeo dorsali subapicali instructis, tarsis gracilibus muticis. Pedes-maxillares robusti fusco-castanei, femore patellaque luteis; patella brevi convexa; tibia patella vix longiore, extus longitudinaliter excavata et apophysibus nigris trinis armata : 1ª basali fere inferiore obtusa, 2ª superiore submedia cariniformi leviter uncata, 3ª apicali, paulo longiore antice directa; tarso magno et convexo, apicem versus acuminato et bulbum magnum superante. — Tasmania : Hobart.

Chresiona nov. gen. — A *Myroni*, cui affine est, differt oculorum linea antica recta, oculis mediis lateralibus plus minus minoribus, oculorum linea postica valde procurva sed oculis minoribus et mediis a lateralibus quam inter se paulo remotioribus, area oculorum mediorum longiore quam latiore.

C. nigrosignata sp. nov. — ♀. Long. 3,8 mill. — Cephalothorax longe ovatus, modice convexus, fulvo-rufescens, parte thoracica utrinque tenuiter nigro-marginata, fere glaber sed parte cephalica postice setis longis erectis paucis munita. Oculi medii antici lateralibus plus triplo minores. Oculi postici magni, medii a sese spatio oculo paulo angustiore distantes. Abdomen magnum, ovatum et convexum, pallide lividum et crebre albido-punctatum, antice vitta longitudinali, angusta, acute lanceolata, postice maculis parvis longis et obliquis biseriatis 5-5, sæpe confluentibus et utrinque punctis inordinatis paucis nigris supra ornatum, subtus concolor vel prope mamillas infuscatum. Mamillæ luteæ, inferiores fusco-rufulæ. Chelæ, partes oris sternumque fulvo-rufula, lævia, parte labiali infuscata, chelarum margine inferiore dentibus parvis quatuor armato. Pedes lutei, femoribus posticis subtus vix distincte fusco-binotatis, pilosi et aculeati, præsertim tibiis metatarsisque posticis. Area genitalis anguste transversa, nigra, fovea media pilosa cordiformi vel semicirculari impressa. — Prom. Bonæ Spei!

C. convexa sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax ovatus, convexus, fulvo-rufescens, parte cephalica postice dilutiore et lineolis binis fuscis tenuibus et abbreviatis notata, thoracica utrinque tenuiter nigro-marginata, parce fulvo-pilosus et parte cephalica postice setis longis paucis munita. Oculi medii antici lateralibus vix duplo minores. Oculi postici mediocres, medii a sese spatio oculo latiore distantes. Abdomen magnum, ovatum, pallide luteum, crebre albido-punctatum, supra vix distincte nigro-variatum sed subtus vitta latissima nigro-olivacea obtectum. Chelæ rufulæ. Partes oris sternumque fusco-rufula. Pedes lutei, aculeati. — Prom. Bonæ Spei!

C. quadrilineata sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — A præcedenti, cui affinis est, differt, cephalothorace angustiore et minus convexo, fulvo-rufulo, parte cephalica lineis nigris quatuor, interioribus longis sed oculos haud attingentibus postice uncatis, exterioribus multo brevioribus et curvatis, abdomine supra albido, antice linea longitudinali, postice maculis parvis biseriatis nigricantibus notato, in lateribus et subtus valde infuscato fere nigro. — Prom. Bonæ Spei!

C. albescens sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — A præcedenti differt cephalothorace convexiore, omnino fulvo-rufescente, haud marginato, lævi et nitido, setis nigris longissimis paucis consperso, oculis posticis paulo minoribus, mediis a sese spatio oculo haud angustiore distantibus, abdomine albido, supra, in parte apicali, maculis minutissimis nigris longis et obliquis biseriatis notato, mamillis anguste fusco-cinctis. — Prom. Bonæ Spei!

Ommatauxesis nov. gen. — Cephalothorax longe ovatus, sat convexus. Oculi quatuor laterales magni, nigri et convexi, aream (fronte angustiorem) vix latiorem quam longiorem et antice quam postice latiorem occupantes. Oculi quatuor medii parvi, inter oculos laterales anticos siti et aream trapeziformem, paulo latiorem quam longiorem et antice quam postice latiorem occupantes, postici anticis minores punctiformes, antici a lateralibus anticis contigui. Clypeus oculis lateralibus anticis haud latior. Chelæ validæ et longæ, ad basin convexæ et geniculatæ, marginibus sulci longe obliquis, superiore dentibus remotis binis, 1° majore, inferiore dentibus minoribus quinque, 3° reliquis paulo majore, armatis, ungue longo. Partes oris, sternum, chelæ, pedesque fere *Cybœi*, sed parte labiali paulo longiore quam latiore apice attenuata atque truncata.

Ab *Emmenommati*, cui sat affinis est, imprimis differt area oculorum lateralium angustiore postice quam antice, et oculis

quatuor mediis minutissimis aream parvam, antice quam postice latiorem, inter oculos laterales anticos sitam, occupantibus.

O. macrops sp. nov. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax luteus, regione oculari trapeziformi nigra, parte cephalica vittis duabus fuscis latis, antice bifidis, postice convergentibus et V magnum formantibus, et vittis mediis binis angustioribus et abbreviatis pallide fuscis, parte thoracica vitta vel macula media fusca maxima leviter dentata, linea marginali nigra tenui vittaque submarginali pallide fusca et parum expressa, notatis. Abdomen subglobosum, supra atrum, testaceo-punctatum, linea media fulvo-testacea tenui et nodosa, antice vittis binis abbreviatis latis et leviter curvatis, dein maculis seriatis, lineam obliquam subtransversam utrinque designantibus, exterioribus magnis, interioribus sensim minoribus, atque ad marginem maculis trinis, cunctis laciniosis albido-testaceis, notatum, subtus fusco-testaceum utrinque linea dilutiore marginatum. Mamillæ luteæ. Chelæ fusco-rufulæ, læves et nitidæ. Partes oris sternumque lutea lævia, parte labiali fusca, sterno ad marginem leviter infuscato. Pedes pallide lutei, femoribus, tibiis metatarsisque cunctis annulis nigricantibus binis cinctis. Area genitalis transversa rufula et coriacea, plagula media parva longitudinali apice obtusa et convexa notata. — Tasmania : Hobart.

Hypsithylla nov. gen. — A *Vorapto* differt oculorum linea antica valde procurva, oculis mediis a lateralibus quam inter se remotioribus, lateralibus ut in *Euprosthenopi* ad marginem anticum sitis sed non prominulis. A *Thanatidio* cui sat affine est, differt oculis lateralibus anticis mediis paulo minoribus, area quatuor mediorum latiore postice quam longiore et oculorum linea postica latiore, pedibus (3^{is} exceptis) longissimis, tarsis filiformibus, ut in *Trechalea* flexuosis, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus longissimis seriatis numerosioribus, in tibiis 8-8 vel 9-9, in metatarsis 5-5 (in *Thanatidio* in tibiis 4-4 vel 5-5, in metatarsis 3-3).

H. linearis sp. nov. — ♀ (pullus). Long. 15 mill. — Cephalothorax fulvus, crebre luteo-pubescens, utrinque antice pilis albis longioribus munitus, humilis et longus, postice quam antice longius attenuatus, parte thoracica sulco medio longo divisa, postice truncata. Oculi singulariter nigro-cincti. Abdomen (valde detritum) cylindraceum et longissimum, cinereo-testaceum. Pedes (3^{is} exceptis) longissimi, lutei, patellis, tibiis metatarsisque ad apicem rufescenti-tinctis, femoribus anticis setis spiniformibus longis biseriatis paucis subtus munitis, tibiis aculeis longissimis 9-9, metatarsis aculeis similibus 5-5, aculeisque lateralibus paulo minoribus, armatis. — Madagascar : Antongil (Mocquerys).

Ilipula nov. gen. — Ab *Hypsithylla*, cui subsimile est, differt parte thoracica paulo latiore, utrinque rotunda, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus paucioribus (in tibiis 4-4, in metatarsis 3 3) multo minoribus et a sese late distantibus, aculeisque lateralibus paucis armatis.

I. anguicula sp. nov. — ♂ et ♀ (pulli). Long. 14-15 mill. — Cephalothorax longus et humilis, fulvus, vitta media latissima olivacea, parum expressa, notatus, crebre luteo-pubescens. Oculi singulariter nigro-cincti. Abdomen longissimum, cylindraceum, antice truncatum, postice leviter acuminatum, cinereo-testaceum. Chelæ, partes oris, sternum, pedesque pallide lutea. Pedes longissimi aculeis tenuibus sat brevibus paucis armati, tarsis filiformibus valde flexuosis. — Annam : Phuc-Son (H. Fruhstorfer).